



Diphenhydramine (Benadryl) Instrucciones de Administracion

Cada 6 horas sea necesario para los síntomas de alergias, reacciones alérgicas y picazón

La dosis adecuada para su niño/a se basa en su peso. Encuentra peso de su niño en la columna de peso del lado izquierdo. A continuación, encontrar qué producto (forma y fuerza / concentración) que tiene en los que aparecen en la fila superior. A continuación, encontrará dosis de su niño en esa columna.

mg = miligramas, ml = mililitros

Peso (libras)	Jarabe 12.5mg/5ml	Tabletas 12.5mg	Tabletas o capsulas 25 mg	Peso (kilogramas)
8-9	1.25ml			4
10-11	2ml			5
12-16	2.5ml	½ tab		6-7
17-21	3.5ml	½ tab		8-9
22-25	4ml	½ tab		10-11
26-33	5ml	1 tab	½ tab	12-14
33-39	6ml	1 tab	½ tab	15-17
40-45	7ml	1 y ½ tabs	½ tab	18-20
46-52	9ml	1 y ½ tabs	½ tab	21-23
53-58	10ml	2 tabs	1 tab	24-26
59-65	11ml	2 tabs	1 tab	27-29
66-72	12ml	2 y ½ tabs	1 tab	30-32
73-80	14ml	2 y ½ tabs	1 tab	33-36
81-88	15ml	3 tabs	1 y ½ tabs	37-40

* Si la dosis mencionado anteriormente hace que su hijo le de demasiado sueño, puede disminuir la cantidad que usted da.

* Lea siempre las etiquetas de los medicamentos con cuidado. Muchos medicamentos sin receta resfriado y la tos incluyen diphenhydramine, así que por favor tenga cuidado si está usando diphenhydramine con otros medicamentos.

* Por favor, no le dé diphenhydramine durante el uso de otros antihistamínicos o medicamentos para la alergia a menos que se lo recomiende su médico.

* Para niños de más de 88 libras (40 kg) por favor refiérase a las instrucciones que figuran en el lado del producto.

* Por favor, llame a la oficina si tiene preguntas o inquietudes.

www.childrenschoicepediatrics.com

972.548.8382