



## Ibuprofen (Advil, Motrin) Instrucciones de Administracion

Cada 6 horas según sea necesario para el dolor o la fiebre > 100.4° F (38° C)

**\*No le dé a los bebés menores de 6 meses de edad a menos que lo indique su médico\***

La dosis adecuada para su niño/a se basa en su peso. Encuentra peso de su niño en la columna de peso del lado izquierdo. A continuación, encontrar qué producto (forma y fuerza / concentración) que tiene en los que aparecen en la fila superior. A continuación, encontrará dosis de su niño en esa columna.

mg = milligramas, ml = mililitros

| Peso (libras) | Jarabe de Infantes' 50mg/1.25ml | Jarabe de Niños' 100mg/5ml | Tabletas 100mg | Tabletas 200mg | Peso (kilogramas) |
|---------------|---------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 8-9           | 1ml                             | 2ml                        |                |                | 4                 |
| 10-11         | 1.25ml                          | 2.5ml                      | ½ tab          |                | 5                 |
| 12-13         | 1.5ml                           | 3ml                        | ½ tab          |                | 6                 |
| 14-16         | 1.75ml                          | 3.5ml                      | ½ tab          |                | 7                 |
| 17-18         | 2ml                             | 4ml                        | ½ tab          |                | 8                 |
| 19-22         | 2.25ml                          | 4.5ml                      | ½ tab          |                | 9                 |
| 23-26         | 2.5ml                           | 5ml                        | 1 tab          | ½ tab          | 10-12             |
| 27-31         | 3ml                             | 6.5ml                      | 1 tab          | ½ tab          | 13-14             |
| 32-35         | 3.75ml                          | 8ml                        | 1 y ½ tabs     | ½ tab          | 15-16             |
| 36-39         | 4ml                             | 9ml                        | 1 y ½ tabs     | ½ tab          | 17-18             |
| 40-44         | 4.75ml                          | 10ml                       | 2 tabs         | 1 tab          | 19-20             |
| 45-48         | 5ml                             | 11ml                       | 2 tabs         | 1 tab          | 21-22             |
| 49-53         | 5.5ml                           | 12ml                       | 2 tabs         | 1 tab          | 23-24             |
| 54-57         |                                 | 13ml                       | 2 y ½ tab      | 1 tab          | 25-26             |
| 58-62         |                                 | 14ml                       | 2 y ½ tab      | 1 tab          | 27-28             |
| 63-66         |                                 | 15ml                       | 3 tabs         | 1 y ½ tabs     | 29-30             |
| 67-71         |                                 | 16ml                       | 3 tabs         | 1 y ½ tabs     | 31-32             |
| 72-75         |                                 | 17ml                       | 3 tabs         | 1 y ½ tabs     | 33-34             |
| 76-80         |                                 | 18ml                       | 3 y ½ tabs     | 1 y ½ tabs     | 35-36             |

\* Cuando el uso de productos tanto ibuprofen y acetaminophen, puede alternarlos cada 3 horas.

\* Por favor, consulte a un médico antes de tomar este a los bebés menores de 6 meses de edad, o niños con problemas de los riñones /renal o problemas de sangrado.

\* Para niños de más de 80 libras (36 kg) por favor refiérase a las instrucciones que figuran en el lado del producto.

\* Por favor, llame a la oficina si tiene preguntas o inquietudes.

[www.childrenschoicepediatrics.com](http://www.childrenschoicepediatrics.com)

972.548.8382